
Coma

richtlijn postanoxisch coma - nvc - 2 richtlijnwerkgroep post-anoxisch coma richtlijn 2011 organisatie nederlandse vereniging voor neurologie nederlandse vereniging voor intensive care **5 8 d i e h d n o z e g t s e t - coma.ulg** - 20 5 8 d i e h d n o z e g t s e t 8 0 0 2 i l u j / i n u j 5 8 d i e h d n o z e g t s e t 8 0 0 2 i l u j / i n u j 21 de grote slaap **hoofdstuk 5 behandeling van acute ontregeling van diabetes ...** - beide condities neemt de mortaliteit toe bij hogere leeftijd, aanwezigheid van coma, hypotensie of ernstige comorbiditeit. definitie en kenmerken **coma, vegetatieve toestand en minimale bewustzijns- toestand** - coma, vegetatieve toestand en minimale bewustzijnstoestand 3 deze brochure geeft uitleg aan familieleden of partners van patiënten met een langdurig verminderd ... **knmg/knmp richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij ...** - niet in coma raken of weer uit een diep coma komen. de vieze smaak van de drank kan, ondanks het gebruik van een anti-emeticum, **prognose op korte en lange termijn - intensivistenopleiding** - hypoglycemische encephalopathie • studie 1: • hypoglycemische encephalopathie: coma of stupor met een bloedglucose lager dan 50 mg/dl (2.77 mmol/l) **crsr ned 291008 - coma.ulg** - 1 coma recuperatie schaal - nederlandstalige herziene versie ©2008 scoreformulier patiënt : datum insult : ... **anamnese glasgow coma-schaal/emv-score ogen openen (e ...** - stabilisatie cwk - bij trauma: noodzakelijk? kijken - inspectie mondholte. uitwendige en inwendige oorzaken van ademwegobstructie? luisteren - heesheid? **glasgow coma scale - centers for disease control and ...** - glasgow coma scale eye opening response • spontaneous--open with blinking at baseline 4 points • to verbal stimuli, command, speech 3 points **knmg/knmp richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij ...** - inhoudsopgave 5 1 inleiding 8 2 de uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding 11 2.1 voorbereiding 11 2.2 euthanasie 13 2.2.1 coma-inductie 14 **bewaking vitale functies - bewustzijn en coma ...** - 4 bewaking vitale functies - hersenfunctie/ neurologische toestand coma - oorzaken ii lokaal = processen in de hersenstam •trauma: hersenstamcontusie, hematoom, dai **coma door clozapine met benzodiazepinen: de rol van flumazenil** - coma door clozapine met benzodiazepines: de rol van flumazenil tijdschrift voor psychiatrie 46 (2004) 3 187 vergissing tevens een lage dosis benzodiazepine, **module1 221110-jvg - icverpleegkundige** - 10-12-2013 3 bewaking vitale functies - herse nfunctie/ neurologische toestand coma - meten is weten helder oldomneveld somnolent soporeus comateus bewaking vitale ... **de stervensfase - oncoline** - een diepe slaaptoestand of coma. onrust en verwardheid het kan voorkomen dat door een gedaald bewustzijn iemands gedrag verandert. **glasgow coma scale - acdis** - glasgow coma scale (gcs) objective measure of consciousness and responsiveness prognostic significance in trauma only valid objective measure in all circumstances **glasgow coma scale (gcs) key - healthgium** - glasgow coma scale (gcs) "key" teasdale g, jennett b. (1974) assessment of coma and impaired consciousness. a practical scale. meetinstrument glasgow coma scale **coma recovery scale-revised - tbims** - crs-r coma recovery scale-revised ©2004 administration and scoring guidelines joseph t. giacino, ph.d. and kathleen kalmar, ph.d. center for head injuries **insulinetherapie: een besloten boek?** - uitvoering de insuline coma therapie werd door sakel ingedeeld in vier fases. tot aan het einde van het ict-tijdperk is dit schema vrijwel ongewijzigd gebleven ... •**nah brochure wat nu?** - w a t i s e e n n i e t - a a n g e b o r e n a t i s e e n n i e t - a a n g e b o r e n h e r s e n l e t s e l c o m a l a t e r n i e t s m e e r h e r i n n e r t . ? e r s e n l e t s e l ? w a t i s e e n n i e t ... **coma hepaticum - henw** - samenvattend kunnen we zeggen dat neurologisch psychiatrische stoornissen, met als extreme fase het coma hepaticum, kunnen ontstaan bij: l. een ernstige ... **zorgcircuit acuut coma bij kinderen - uz gent. denk zorg** - het raadplegen of het gebruik van deze procedure ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. het uz gent kan op generlei ... **bijsluiter: informatie voor de gebruiker leponex 25 mg ...** - leponex mag niet toegediend worden aan iemand die bewusteloos of in coma is. wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? **de doolhof na coma - zorgstandaardnah** - de doolhof na coma gereformeerd dagblad, huib de vries, 15 november 2016 de primaire medische zorg na ernstig hersenletsel is in nederland uitstekend geregeld. **bepalen van de prognose van een coma na reanimatie - ntv** - 308 ned tijdschr geneesk. 2008 9 februari;152(6) als na een reanimatie wél de circulatie van de patiënt her-steld is, maar niet het bewustzijn, rijst bij de ... **uitgebreide handleiding voor de iskra slimme meter** - 2. wat is een slimme meter? een 'slimme meter' is een nieuwe generatie meter en vervangt de traditionele meters. de slimme meter is digitaal en registreert uw **ademen zonder obstakels - hannekekalf** - 1 stabiel is, met een glasgow-coma-score van 8 of meer; 2 adequaat kan hoesten en slikken; 3 goed kan ademen met een lege cuff gedurende minstens 24 uur en bo- **glasgow coma schaal: doe het zo!** - open zonder aansporing open na een gesproken of geroepen verzoek open na het geven van druk t.h.v. de vingertop ogen zijn gesloten door een lokale beperkende factor **vroege intensieve neurorevalidatie informatie voor familie ...** - iemand die langer dan twee à drie weken in coma ligt, komt daar uit door over te gaan naar de vegetatieve toestand of komt te overlijden ... **delier (acute verwardheid) - hulpgids** - 3 delier (acute verwardheid) een delier komt, net als koorts, regelmatig voor bij mensen met een lichamelijke ziekte. de verwardheid bij een delier is **ammoniak in bloed: indicaties, klinische betekenis en ...** - coma worden ten gevolge van verhoogde aromatische aminozuren vaak erg lage ammoniakwaarden (soms nul) in het bloed gevonden, terwijl een hoog ammo- **dai b e t s i c h e k e t o a c i d o s e - huderf** - in geval van coma moet een maagsonde worden geplaatst om de maag te ledigen. de blaas

wordt enkel gekathete-riseerd als het comateuze kind niet watert. **hepatisch coma na toediening paclitaxel (taxol®) - ge-bu** - 1 / 1 hepatisch coma na toediening paclitaxel (taxol®) nr 4 | 1998 (32) | pagina 49 | let op! paclitaxel (taxol®) wordt in toenemende mate gebruikt bij de ... **coma and brain death - stritch school of medicine** - coma and brain death (dr. merchut) coma 1. clinical features of coma coma is defined as a sleep-like, unarousable, unresponsive state. other **forty years on: updating the glasgow coma scale** - 12 nursing times 15.10.14 / vol 110 no 42 / nursingtimes nursing practice review neurology keywords:consciousness/glasgow coma scale/clinical assessment/ **table i. diagnostic scoring system for myxedema coma*** - table i. diagnostic scoring system for myxedema coma* thermoregulatory dysfunction (temperature of/ c) points >95/35 0 89.6-95/32-35 10